



COLOMBABIANCA

VITINEWS

Notiziario tecnico viticolo a cura del gruppo tecnico viticolo
Delle CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. Agr.

AVVERTIMENTO N°2 | **MAGGIO 2022**



SITUAZIONE METEOCLIMATICA

Il vortice che si sta scavando una strada verso il Mediterraneo centro-occidentale riuscirà a raggiungere entro il weekend anche il Sud Italia, coinvolgendo anche la nostra regione. Sarà inoltre affiancato dall'ingresso di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa, con conseguente incremento dell'instabilità e temperature destinate a calare vistosamente entro sabato e domenica.



SITUAZIONE FENOLOGICA

Grazie al **rialzo termico** lo sviluppo della vite ha fatto un considerevole progresso in tutti gli ambienti vitati. Il ritardo del **germogliamento** quest'anno è avvenuto perché le **temperature** registrate a marzo e parte di aprile sono stati tra **le più basse** registrati degli ultimi vent'anni.

Nel nostro comprensorio occidentale: lo sviluppo dello stadio fenologico della vite è per le:

- **Varietà a germogliamento precoce:** inizio ingrossamento acini, le bacche sono delle dimensioni di un grano di pepe;
- **Varietà tardive:** piena fioritura, con il 50% delle caliptre cadute;

L'avanzamento di fase prosegue in maniera molto dinamica e così pure la spinta vegetativa.



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Vi ricordiamo che prima di iniziare un trattamento fitosanitario è opportuno controllare:

1. controllare la funzionalità dei mezzi (atomizzatore, ugelli, ecc.);
2. eseguire in maniera corretta i trattamenti (velocità di avanzamento, pressioni, dosaggi e quantità di miscela, i trattamenti vengono effettuati fila per fila);
3. utilizzare un adeguato volume d'acqua per la distribuzione dei prodotti (proporzionale alla vegetazione, 200 litri/Ha nelle prime fasi vegetative e volumi maggiori nelle fasi di piena vegetazione, e non inferiori ai 600 litri/ha);
4. trattamenti devono essere fatti su vegetazione asciutta e rispetto dei tempi di assorbimento dei prodotti (dalle 4 alle 6 ore);
5. rispettare i dosaggi consigliati in etichetta;
6. non sotto-dosare!
7. ridurre il numero di giorni tra un trattamento e il successivo soprattutto quando abbiamo un buon accrescimento della vegetazione (n° di foglie nuove per settimana) e la velocità di sviluppo dei grappoli va verificata con molta attenzione, in particolare quando nel caso del biologico si utilizzano prodotti di copertura, la vegetazione sviluppatasi dopo l'intervento fitosanitario non è protetta.



Peronospora: nella maggior parte dei vigneti è stata raggiunta la fase fenologica che determina l'inizio della suscettibilità all'infezione e sono state superate le temperature medie minime per lo sviluppo della peronospora. Dopo l'evento piovoso della scorsa settimana, sono state riscontrate le prime macchie in alcuni vigneti del comprensorio centrale della Provincia. In questi casi si consiglia di intervenire a ridosso delle prossime precipitazioni previste con prodotti di copertura con le dosi riportate in etichetta.

Oidio: con queste condizioni meteorologiche è aumentato il rischio di infezioni primarie sulle foglie, infatti sono presenti i primi sintomi su foglia che sono stati notati in questa settimana. Questo fungo è stato fin qui favorito dalle condizioni ambientali ed è senza dubbio quello più pericoloso in prospettiva, è bene abbinare lo zolfo a dose media o alta, alla copertura antiperonosporica.





COLOMBABIANCA

